

CORONAVIRUS RECOMMANDATIONS SUR L'USAGE DU MASQUE POUR LES PROFESSIONNELS - SYNTHÈSE

QUI DOIT PORTER UN MASQUE CHIRURGICAL?

État de santé du professionnel

MALADE (Ne pouvant pas travailler)

RETOUR AU DOMICILE

Téléphoner au médecin traitant

PAS DE MASQUE

PETIT RHUME, pas de température (Service à assurer)

MASQUE

PAS DE SYMPTÔME

S'occupe des patients/résidents/bénéficiaires

OUI

Patients/résidents/bénéficiaires suspects ou confirmés COVID-19 ?

OUI

MASQUE

NON

PAS DE MASQUE

Il n'est pas recommandé au personnel des institutions **sans contact avec les résidents/bénéficiaires** (administratif, technique, réception, etc.) de porter régulièrement un masque. Ceux-ci peuvent tout de même utiliser un masque en tissu s'ils le souhaitent.

Merci d'utiliser les masques avec parcimonie!
Le stock de masques doit être conservé sous clé.

Comment manipuler le masque?

✓ Le masque doit être manipulé **après** un lavage des mains au savon d'au moins **40 à 60 secondes**

Quand il n'est pas utilisé :

✓ Le masque peut être porté **autour du cou**

✓ Le masque peut être **conservé** dans une **enveloppe en papier** ou un **contenant personnalisé lavable**

✗ Ne **JAMAIS** toucher l'avant

✗ Ne **JAMAIS** le conserver dans une poche

✗ Ne **JAMAIS** garder un masque dont la saleté est visible

Combien de temps peut-on utiliser un masque?

Jusqu'à 8 heures d'intervention en tout.
Il convient d'enlever le masque lorsqu'on n'est pas au contact du résident ou bénéficiaire malade.

Différences d'utilisation

Masque chirurgical =

Prévention et protection pour les **professionnels** de l'aide et du soin en contact direct avec **patients/résidents/bénéficiaires** suspects ou confirmés COVID-19.

Masque FFP2 =

Protection pour les **professionnels des soins de santé** pendant les actes **aérosolisants** (exemples : intubation, Réanimation Cardio Pulmonaire, trachéotomie...).

Cette communication n'est valide que dans le contexte de la phase épidémique du coronavirus. Les recommandations pourront être adaptées sur base de l'évolution de l'épidémie et des stocks. Plus d'infos : www.aviq.be/coronavirus ou contactez votre inspecteur ou auditeur. Recommandations du 23 mars 2020.



CORONAVIRUS RECOMMANDATIONS SUR L'USAGE DU MASQUE POUR LES PROFESSIONNELS - DÉTAILS

QUEL MASQUE UTILISER?

MASQUE CHIRURGICAL



Prévention et protection

- 📍 Pour les professionnels de l'aide et du soin en contact direct avec patients/résidents/bénéficiaires suspects ou confirmés COVID-19.
- 📍 Voir « Qui doit porter un masque chirurgical? »

MASQUE EN TISSU « FAIT MAISON »

- 📍 Peut être utilisé par le personnel qui n'est pas en contact avec les résidents ou bénéficiaires.
- 📍 Il doit être lavé quotidiennement à 60°C.

Exemple :

- 📍 Personnel administratif
- 📍 Personnel technique
- 📍 Personnel du laboratoire
- 📍 Personnel d'accueil n'ayant aucun contact direct avec les patients

MASQUE FFP2



Protection pendant les actes aérosolisants

Actes qui favorisent la dispersion de particules suffisamment petites et légères pour être transportées dans l'air

- 📍 Pour les professionnels des soins de santé.

Exemples d'actes aérosolisants pendant lesquels utiliser un masque FFP2 :

- 📍 Intubation et manœuvres associées
- 📍 Réanimation Cardio Pulmonaire
- 📍 Aspiration trachéale en circuit ouvert
- 📍 Bronchoscopie
- 📍 Sputum induit (expectoration provoquée par geste)
- 📍 CPAP (association d'une ventilation spontanée et d'une pression expiratoire positive continue)
- 📍 BIPAP (association d'une ventilation spontanée, d'une aide inspiratoire et d'une pression expiratoire positive à deux niveaux de pression)
- 📍 Oxyflow (dispositif de traitement d'oxygène)
- 📍 Trachéotomie

Cette communication n'est valide que dans le contexte de la phase épidémique du coronavirus. Les recommandations pourront être adaptées sur base de l'évolution de l'épidémie et des stocks. Plus d'infos : www.aviq.be/coronavirus ou contactez votre inspecteur ou auditeur.

Recommandations du 23 mars 2020.